

Complicación inhabitual del postoperatorio de la estenosis hipertrófica del píloro

Dres. RUBEN AÑON, CESAR ARRUTTI, MANLIO CHIZZOLA
y EDUARDO ANAVITARTE *

Presentamos la observación de una complicación postoperatoria inhabitual de la estenosis hipertrófica del píloro.

CASO CLINICO

Lactante de sexo femenino de 2 meses y medio de edad, que comienza al mes de vida con vómitos blancos, explosivos, fáciles, característicos del síndrome pilórico.

Se realiza tratamiento médico durante un mes y medio que resulta inefectivo, llevando al enfermo a la deshidratación, pérdida de peso y trastornos metabólicos.

Se efectúa estudio de gastroduodeno que confirma el diagnóstico clínico de estenosis hipertrófica del píloro. Después de 24 horas de preparación preoperatoria con reposición de líquidos y electrolitos se realiza piloromiotomía clásica.

A los 3 días del postoperatorio comienza con vómitos biliosos reiterados, seguidos de distensión abdominal y depresión sensorial.

Se efectúan entonces nuevas radiografías de abdomen que muestran imágenes de oclusión mecánica del intestino delgado.

Se reinterviene constatándose una invaginación ileoileal que fue posible desinvaginar fácilmente.

La evolución postoperatoria fue totalmente satisfactoria.

COMENTARIO

Destacamos el interés de esta rara observación; al tiempo de asistir a este paciente, dos de nosotros (M. CH. y C. A.) operaron un caso similar.

Pensamos que el levantamiento del obstáculo pilórico es posible determine trastornos del peristaltismo intestinal que produzcan la invaginación.

No hemos encontrado mención en la literatura de esta complicación del tratamiento quirúrgico de la estenosis pilórica del lactante.

RESUMEN

Presentación de una rara observación de invaginación ileoileal acaecida en el postoperatorio inmediato de una piloromiotomía de Fredet por hipertrofia pilórica.

RÉSUMÉ

Présentation d'une observation peu fréquente d'invagination iléo-iléale survenue dans le post-opératoire immédiat d'une pyloromyotomie de Fredet pour une hypertrophie pylorique.

SUMMARY

This is a rare case of ileo-ileal invagination occurring in the immediate postoperative period in a case of Fredet's pyloromyotomy, due to hypertrophy of pilorus.

* Cirujano de Guardia del Hospital Pereyra Rossell, Cirujanos de Bureau del M.S.P., del M.S.P., Profesor Adjunto de Cirugía, Fac. Med. Montevideo.

Presentado el 5 de abril de 1972.